

HERBICIDES

Nom Commercial	Matières Actives	Formulation	Classe Toxicologique	No d'Homologation	Nuisibles	Culture	Usages	D.A. R	Mode et Matériel d'Application	Distributeur No de tel et adresse
SELECT 120 EC	Cléthodime : 120 g/l	EC	III	07 0736 He	Graminées annuelles	Ananas	Utilisé à la dose de 0,8 l/ha contre les graminées annuelles en culture de ananas avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à dos	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
STOMP AQUA 455 CS	Pendiméthaline : 455 g/l	CS	III	18 2017 He	Graminées annuelles, inclut Rottboellia cochinchinensis et les dicotylédones annuelles	Canne à Sucre	Utilisé à la dose de 3l/ha contre les mauvaises herbes en culture de canne à sucre en prégermination des adventices	Sans objet	Pulvérisation en prélevée et en post-levée précoce des adventices avec un pulvérisateur à dos à pression entretenue	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIFOR 500 SC	Prométryne : 250 g/l Fluométuron : 250 g/l	SC	III	90 0081 He	Graminées et dicotylédones	Coton	Utilisé à la dose de 2,5 l/ha contre les graminées et dicotylédones en culture de coton	Sans objet	Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à dos à pression entretenue	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIFOR G	Fluométuron : 250 g/l Prométryne : 250 g/l Glyphosate : 60 g/l	G	III	04 0662 He	Graminées et dicotylédones	Coton	Utilisé à la dose de 2 kg/ha pour le désherbage du cotonnier avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à dos à conventionnel	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIFOR G 858 WG	Fluométuron : 383 g/kg Glyphosate : 92 g/kg Prométryne : 383 g/kg	WG	III	09 0866 He	Graminées et dicotylédones	Coton	Utilisé à la dose de 2kg/ha pour le désherbage du cotonnier avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Appliquer le produit 24 h après le semis du coton, après la levée des adventices	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
PANTERA 40 EC	Quizalofop-P-Tefuryl : 40 g/l	EC	III	10 1001 He	Graminées annuelles	Coton	Utilisé aux doses de 0,9 l/ha pour les plantules d'adventices et de	Sans objet	Traitement foliaire avec un pulvérisateur à	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205

							1,5 l/ha pour les plants adultes contre les graminées annuelles nuisibles du cotonnier		dos à pression entretenue	
SELECT 120 EC	Cléthodime : 120 g/l	EC	III	07 0736 He	Graminées annuelles	Coton	Utilisé à la dose de 0,8 l/ha contre les graminées annuelles en culture de coton avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à dos	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIHERBE 720 SL	2,4 D Sel d'amine : 720 g/l	SL	II	91 0193 He	Mauvaises herbes	Cultures céréalières	Utilisé à la dose de 1l/ha contre les mauvaises herbes des cultures	Sans objet	Traitement foliaire avec un pulvérisateur à dos à pression entretenue	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
PANTERA 40 EC	Quizalofop-P-Tefuryl : 40 g/l	EC	III	10 1001 He	Graminées annuelles	Cultures maraichères et vivrières	Utilisé aux doses de 0,9 l/ha pour les plantules d'adventices et de 1,5 l/ha pour les plants adultes contre les graminées annuelles nuisibles des cultures	Sans objet	Traitement foliaire avec un pulvérisateur à dos à pression entretenue	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
AKIZON 40 SC	Nicosulfuron : 40 g/l	SC	III	98 0411 He	Graminées et dicotylédones annuelles	Maïs	Utilisé à la dose de 1,5l/ha contre les graminées et les dicotylédones annuelles et pérennes en culture de maïs	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
AKIZON 40 SC	Nicosulfuron : 40 g/l	SC	III	98 0411 He	Graminées et dicotylédones annuelles	Maïs	Utilisé à la dose de 1,5l/ha contre les graminées et les dicotylédones annuelles et	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur, à appliquer sur les	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205

							pérennes en culture de maïs		herbes en dessous du maïs	
CALLIHERBE 720 SL	2,4 D Sel d'amine : 720 g/l	SL	II	91 0193 He	Graminées et dicotylédones annuelles	Riz	Utilisé à la dose de 1l/ha contre les mauvaises herbes en culture de riz	Sans objet	Traitement foliaire avec un pulvérisateur à dos à pression entretenue	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIFOR 500 SC	Prométryne : 250 g/l Fluometuron : 250 g/l	SC	III	90 0081 He	Graminées et dicotylédones annuelles	Coton	Utilisé à la dose de 2,5 l/ha contre les graminées et dicotylédones en culture de coton	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIFOR G	Fluometuron : 250 g/l Prométryne : 250 g/l Glyphosate : 60 g/l	WG	III	04 0662 He	Mauvaises herbes	Coton	Utilisé à la dose de 4 l/ha juste après le semis des graines de coton (au plus tard le lendemain) à l'aide d'un pulvérisateur à dos.	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIFOR G 858 WG	Fluométuron : 383 g/kg Glyphosate : 92 g/kg Prométrine : 383 g/kg	WG	III	09 0866 He	Mauvaises herbes	Coton	Utilisé à la dose de 2kg/ha pour le désherbage du cotonnier avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIHERBE 720 SL	2,4 D Sel d'amine : 720 g/l	SL	II	91 0193 He	Mauvaises herbes	Riz	Utilisé à la dose de 1l/ha contre les mauvaises herbes	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLISTAR 250 EC	Oxadiazon : 250 g/l	EC	III	06 0719 He	Mauvaises herbes	Riz	Utilisé à la dose de 3l/ha contre les adventices monocotylédones et dicotylédones	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLIHERBE 720 SL	2,4 D Sel d'amine : 720 g/l	SL	II	91 0193 He	Graminées et dicotylédones annuelles	Autres céréales	Utilisé à la dose de 1l/ha contre les mauvaises herbes	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205

CALLITRYNE 500 SC	Amétryne : 500 g/l	SC	III	90 0172 He	Mauvaises herbes	Ananas	Utilisé à la dose de 5l/ha contre les adventices suivants : <i>Digitaria sp</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Panicum maximum</i> et <i>paspalum sp</i>	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLITRYNE 80 WP	Amétryne : 80%	WP	III	90 0171 He	Mauvaises herbes	Ananas	Utilisé à la dose de 4kg/ha contre les adventices	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLITRYNE PLUS SC	Amétryne : 250 g/l Simazine : 250 g/l	SC	II	98 0434 He	Mauvaises herbes	Banane	Utilisé à la dose de 5l/ha	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLITRYNE 500 SC	Amétryne : 500 g/l	SC	III	90 0172 He	Mauvaises herbes	Banane	Utilisé à la dose de 5l/ha contre les adventices suivants : <i>Digitaria sp</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Panicum maximum</i> et <i>paspalum sp</i>	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLITRYNE 500 SC	Amétryne : 500 g/l	SC	III	90 0172 He	Mauvaises herbes	Canne à sucre	Utilisé à la dose de 5l/ha contre les adventices suivants : <i>Digitaria sp</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Panicum maximum</i> et <i>paspalum sp</i>	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLITRYNE 80 WP	Amétryne : 80%	WP	III	90 0171 He	Mauvaises herbes	Banane	Utilisé à la dose de 4kg/ha contre les adventices	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALLITRYNE 80 WP	Amétryne : 80%	WP	III	90 0171 He	Mauvaises herbes	Canne à sucre	Utilisé à la dose de 5kg/ha contre les adventices	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALRIZ 432 EC	Propanil : 360 g/l	EC	III	02 0580 He	Graminées et dicotylédones	Riz	Utilisé à la dose de 5 l/ha contre les mauvaises herbes	Non applicable	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte

	Triclopyr : 72 g/l						(Graminées et dicotylédones)			d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CALZONE 480 EC	Clomazone : 480 g/l	EC	III	08 0823 He	Mauvaises herbes	Canne à sucre	Utilisé à la dose de 2,5 l/ha seul, 1,70 à 2 l/ha en association avec l'Amicarbazone et/ou l'Hexazinone contre les mauvaises herbes en culture de canne à sucre sur sol propre et humide avec 200 litres de bouillie à l'hectare	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
CRYSTAL 280 EC	Cyhalofop-butyl : 100 g/l Triclopyr: 180 g/l	EC	III	19 2132 He	Mauvaises herbes	Riz	Utilisé à la dose de 2 l/ha en application de post-levée, efficace contre les adventices (Dicotylédones, Graminées et Cyperacées) et pérennes présentes dans les champs de riz : <i>Ludwigia hysopifolia L.</i> , <i>Oldenlandia corymbosa L.</i> , <i>Spilanthus uliginosa Sw.</i> , <i>Lindernia nummularifolia L.</i> , <i>Cyperus difformis L.</i> , <i>Fimbristylis littoralis Gaud.</i> , <i>Cyperus iria L.</i> , <i>Cyperus haspan L.</i> , <i>Panicum laxum L.</i>	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205

PANTERA 40 EC	Quizalofop-P-Tefuryl : 40 g/l	EC	III	10 1001 He	Mauvaises herbes graminées	Coton	Utilisé à la dose de 0,9 l/ha contre les adventices graminées	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
PENCAL 500 EC	Pendiméthaline : 500 g/l	EC	III	15 1599 He	Mauvaises herbes	Riz	Utilisé à la dose de 2,5 l/ha en post-levée des adventices	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
SELECT 120 EC	Cléthodime : 120 g/l	EC	III	07 0736 He	Mauvaises herbes	Coton	Utilisé à la dose de 0,8 l/ha contre les graminées annuelles en culture de Coton avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
PANTERA 40 EC	Quizalofop-P-Tefuryl : 40 g/l	EC	III	10 1001 He	Mauvaises herbes graminées	Cultures maraichères et vivrières	Utilisé à la dose de 0,9 l/ha contre les adventices graminées	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
SELECT 120 EC	Cléthodime : 120 g/l	EC	III	07 0736 He	Mauvaises herbes	Ananas	Utilisé à la dose de 0,8 l/ha contre les graminées annuelles en culture d'Ananas avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205
SELECT 120 EC	Cléthodime : 120 g/l	EC	III	07 0736 He	Mauvaises herbes	Cultures maraichères et vivrières	Utilisé à la dose de 0,8 l/ha contre les graminées annuelles avec 200 litres de bouillie par hectare	Sans objet	Pulvérisation foliaire avec un pulvérisateur	Callivoire, Marcory, Zone 4, Rue Clément Ader, Abidjan, Côte d'Ivoire +225 27 21 35 75 205