

FORMULAIRE INDEX DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

HERBICIDES

Nom Commercial	Matières Actives	Formulation	Classe Toxicologique	No d'Homologation	Nuisibles	Culture	Usages	D.A.R	Mode et Matériel d'Application	Distributeur No de tel et adresse
Alion 500 SC	Indaziflam 500 g/L	SC	III	15 1684 He	Adventices annuelle (graminées et dicotylédones)	Banane Hévéa Palmier à huile	Adventice de pré-émergence des adventices des cultures de banane, Hévéa, palmier à huile	Sans objet	Dose d'application : une seule application de 0,1 L/ha par an. Appliquer sur des plantations établies (plants âgés de plus de 3 ans) Application avec le pulvérisateur à dos. Pour plus de détails sur les recommandations, voir l'étiquette du produit	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11
Auxo 337 EC	Tembotrione 50 g/L+ Isoxadifen-ethyl 25g/L+ bromoxynil octanoate 262 g/L	EC	II	17 1941 He	Adventices annuelles (dicotylédones, graminées)	Maïs	Herbicide de post-levée de la culture du maïs pour le contrôle les dicotylédones, et des graminées annuelles	Sans objet	Dose d'application : 1,5 L/Ha Application au pulvérisateur	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11

HERBICIDES

Nom Commercial	Matières Actives	Formulation	Classe Toxicologique	No d'Homologation	Nuisibles	Culture	Usages	D.A.R	Mode et Matériel d'Application	Distributeur No de tel et adresse
Council Activ 30 WG	Ethoxysulfuron 100 g/L+ Triafamone 200 g/L	WG	III	17 1844 He	Graminées; dicotylédones, cyperacées	Riz	Herbicide sélectif du riz irrigué appliqué en post levée précoce après repiquage ou semis direct	60 jours	Dose d'application: 120 g/kg Council Activ 30 WG est très sélectif du riz lorsqu'il est appliqué conformément aux recommandations de l'étiquette. Pour plus de détails sur les précautions et les recommandations, veuillez vous référer à l'étiquette du produit.	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11
Laudis 630 SC	Tembotrione 420 g/L+ Isoxadifen - ethyl 210 g/L	SC	III	14 1504 He	Adventices annuelles (dicotylédones, graminées)	Maïs	Herbicide de post levée, prélevée de la culture du maïs	14 jours	Dose d'application : 0,25 L/Ha Application au pulvérisateur. Il s'emploie en post levée stricte entre le stade de 2 à 9 feuilles.	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11

HERBICIDES

Nom Commercial	Matières Actives	Formulation	Classe Toxicologique	No d'Homologation	Nuisibles	Culture	Usages	D.A.R	Mode et Matériel d'Application	Distributeur No de tel et adresse
----------------	------------------	-------------	----------------------	-------------------	-----------	---------	--------	-------	--------------------------------	-----------------------------------

Liberator 500 SC	Diflufenican 100 g/L+ Flufenacet 400 g/L	SC	III	15 1598 He	Adventices annuelles (graminées, dicotylédones, Cyperacées)	Coton	Herbicide de pré-levée, sélectif du cotonnier	Sans objet dans le strict respect des recommandations d'usage	Dose d'application : 0,5 L/Ha Application au pulvérisateur à dos. Une application/ cycle. Traiter le jour ou le lendemain du semis en pré-levée des adventices et du cotonnier.	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11
Merlin Combi 575 SC	Aclonifen 500 g/L+ Isoxaflutole 75 g/L	SC	III	12 1220 He	Adventices annuelles (graminées, dicotylédones)	Maïs	Herbicide de post-semis, pré-levée de la culture du maïs	Sans objet dans le strict respect des recommandations d'usage	Dose d'application : 0,5 L/ha Une seule application. Application au pulvérisateur à dos. A appliqué en post semi, en pré-lévée de la culture du maïs.	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11

HERBICIDES

Nom Commercial	Matières Actives	Formulation	Classe Toxicologique	No d'Homologation	Nuisibles	Culture	Usages	D.A.R	Mode et Matériel d'Application	Distributeur No de tel et adresse
Merlin Flexx 480 SC	Isoxaflutole 240 g/L+ Cyprosulfamide 240 g/L	SC	III	10 0990 He	Adventices annuelles (Graminées et Dicotylédones)	Canne à sucre vierge et	Herbicide de pré-émergence de la canne à sucre de repousse, de la	Sans objet dans le strict	Dose d'application : canne vierge : 0,4 L/Ha, en pré-levée	AFCHEM SOFACO Abidjan. Treichville - Zone 3C 30 BP 674 Abidjan 30

						de repousse	canne à sucre vierge et des adventices	respect des recommandations d'usage	Canne repousse : 0,6 L/ha, en pré-émergence Application au pulvérisateur à dos.	Tel: + 225 21 21 63 70 / 21 25 23 61
RoundUp XL 369 SL	Glyphosate acide 360 g/L	SL	III	19 2110 He	Adventices annuelles	Hévéa, banane dessert et jachères	Herbicide Total des cultures de la banane, de l'hévéa et des jachères	Sans objet.	Dose d'application : 3 – 6 l/ha Dose à appliquer en fonction du type et de l'âge de la cible à traiter. Application au pulvérisateur	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11
RoundUp Turbo 450 SL	Glyphosate 450 g/L (551 g/l sel de potassium)	SL	III	09 0848 He	Adventices annuelles	Toute culture, jachères	Herbicide Total pour le désherbage de toute cultures en traitement dirigé et des jachères	Sans objet.	Dose d'application : 2,5 – 3 l/ha Dose à appliquer en fonction du type et de l'âge de la cible à traiter. Application au pulvérisateur	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tel. +225 21 21 61 11

HERBICIDES

Nom Commercial	Matières Actives	Formulation	Classe Toxicologique	No d'Homologation	Nuisibles	Culture	Usages	D.A.R	Mode et Matériel d'Application	Distributeur No de tel et adresse
RoundUp 720 SG	Glyphosate 720 g/kg	SG	III	12 1180 He	Adventices annuelles	Hévéa, palmier à huile et jachères	Herbicide Total des cultures du palmier à huile, de l'hévéa et des jachères	Sans objet.	Dose d'application : palmier à huile : 1,5 à 2 kg/ha Hévéa et jachères : 4 kg/ha	Bayer West-Central Africa S.A. Abidjan - Marcory Zone 4C Angle rue Pierre et Marie Curie/ rue Paul Langevin 30 BP 461 Abidjan 30 Côte d'Ivoire

									Dose à appliquer en fonction du type et de l'âge de la cible à traiter. Application au pulvérisateur	Tel. +225 21 21 61 11
Sencor Plus 517,5 SC	Isoxaflutole 240 g/L+ Cyprosulfamide 240 g/L	SC	II	10 0978 He	Adventices annuelles (Graminées et Dicotylédones)	Canne à sucre	Herbicide de pré-émergence des adventices et de la canne à sucre de repousse	Sans objet sans le strict respect des recommandations d'usage	Dose d'application : 1,5 L/ha. Une seule application/cycle. A appliquer sur les plantations établies (plants âgés de plus de trois ans) Application au pulvérisateur à dos.	AFCHEM SOFACO Abidjan. Treichville - Zone 3C 30 BP 674 Abidjan 30 Tel: + 225 21 21 63 70 / 21 25 23 61